

## > Conseil de la semaine

Les 500° jour sont quasiment atteints dans toutes les zones de plaine et l'ensemble de la Piège. Il faut donc cesser le déprimage des prairies précoces destinées à la constitution de stocks.


Par contre sur les prairies permanentes et tardives, le déprimage peut être réalisé sur l'ensemble du département excepté les zones de montagne au-delà de 600 à 700 m sur les Pyrénées et la Montagne Noire.

Les premières coupes d'ensilage ou d'enrubannage approchent et pourront avoir lieu certainement d'ici une quinzaine de jours sur les prairies précoces de l'ouest Audois au stade début épiaison des ray-grass afin d'optimiser leurs valeurs alimentaires.



### Somme des températures à la date du : 28 Mars 2016

COMMUNES	CUMUL
Alaigne ( 320 m )	481 ° jour
Belcaire ( 1002 m )	237 ° jour
Castelnaudary ( 170 m )	496 ° jour
Fanjeaux ( 360 m )	497 ° jour
Granes ( 312 m )	464 ° jour
Labécède Lauragais ( 306 m )	423 ° jour
Les Martyrs ( 780 m )	260 ° jour
Mouthoumet ( 538 m )	398 ° jour
Saint Benoit ( 406 m )	388 ° jour
Puivert ( 510 m )	429 ° jour
Carcassonne ( 102 m )	510 ° jour



Ces sommes de température sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

## A retenir

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles.

	Départ en végétation	Epi à 5 cm du sol	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage	Foin précoce	Foin tardif
<b>Prairie temporaire précoce</b>	250 ° jour	500 ° jour	800 ° jour	1000 ° jour	1200 ° jour
<b>Prairie permanente fertile et précoce</b>	300 ° jour	500 ° jour	900 ° jour	1100 ° jour	1300 ° jour
<b>Prairie permanente de fertilité moyenne</b>	400 ° jour	800 ° jour	1000 ° jour	1400 ° jour	1600 ° jour