

> Conseil de la semaine

Les premières coupes d'enrubannage ou d'ensilage peuvent être programmées dès cette fin de semaine ou courant semaine prochaine sur les parcelles de Ray-grass précoces de l'Ouest Audois et du centre du département.


Malgré un hiver doux, les sommes de température de l'ensemble des stations météo sont supérieures de 40 à 50 ° en date du 10 avril par rapport à 2015, ce qui équivaut à un développement végétatif des graminées quasi identique avec seulement quelques jours d'avance.

Par contre des récoltes précoces proches des stades de développement phénologiques (début épiaison, épiaison...) permettent d'améliorer la valeur alimentaire de ses fourrages et d'optimiser le rendement global de ses parcelles.



Somme des températures à la date du : 10 avril 2016

COMMUNES	CUMUL
Alaigne (320 m)	628 ° jour
Belcaire (1002 m)	331 ° jour
Castelnaudary (170 m)	646 ° jour
Fanjeaux (360 m)	647 ° jour
Granes (312 m)	608 ° jour
Labécède Lauragais (306 m)	556 ° jour
Les Martyrs (780 m)	353 ° jour
Mouthoumet (538 m)	526 ° jour
Saint Benoît (406 m)	514 ° jour
Puivert (510 m)	576 ° jour
Carcassonne (102 m)	665 ° jour



Ces sommes de température sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

A retenir

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles.

	Départ en végétation	Epi à 5 cm du sol	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage	Foin précoce	Foin tardif
Prairie temporaire précoce	250 ° jour	500 ° jour	800 ° jour	1000 ° jour	1200 ° jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 ° jour	500 ° jour	900 ° jour	1100 ° jour	1300 ° jour
Prairie permanente de fertilité moyenne	400 ° jour	800 ° jour	1000 ° jour	1400 ° jour	1600 ° jour

de la semaine