

# BULLETIN FOURRAGE

## > Surveiller l'ensemble de vos cultures de stocks, leurs pousses s'annoncent PREMATUREES

Les chantiers **d'ensilage ou d'enrubannage** des zones de plaine doivent être achevés et ceux de zone de moyenne altitude peuvent se réaliser sur l'ensemble des prairies. En effet la quasi-totalité des graminées ont atteint et dépassé le stade de début d'épiaison ; stade optimal recherché pour assurer la meilleure valeur alimentaire des fourrages même si la quantité n'est pas forcément au rendez vous en raison d'un **déficit hydrique** qui commence à se faire ressentir (pas de pluviométrie depuis le 10 avril). Des récoltes précoces peuvent permettre de réaliser de bonnes deuxièmes coupes.




A ce jour, les sommes de températures montrent une avance de végétation de 10 à 15 jours (+ 80 à 100 °j par rapport à 2016), les **premières coupes de foin** vont pouvoir se réaliser sur des prairies précoces des zones de plaine du Limouxin et de la Piège, ainsi que sur des prairies de légumineuse luzerne, sainfoin.

**Surveiller vos méteils** destinés à l'ensilage ou à l'enrubannage, les plus précoces pourront se réaliser courant semaine prochaine avec comme stade repère la floraison des protéagineux et début du stade grain laiteux de la céréale destinés essentiellement à des troupeaux laitiers. En troupeau viande, on peut attendre le stade grain pâteux de la céréale ce qui permet d'améliorer le rendement de la parcelle.

Dans la mesure du possible, **valoriser et pratiquer le pâturage** de vos prairies qui est une source alimentaire la moins couteuse et d'excellente qualité à cette période ( au stade début épiaison valeur moyenne des graminées 0.89 UF et 13% de MAT).

Sommes des températures à la date du 23 avril 2017

COMMUNES	TEMPERATURE	PLUVIOMETRIE DE- PUIS LE	PLUVIOMETRIE AU
		01/01/2017	01/04/2017
Alaigne (320 m)	922° jour	223 mm	4.5 mm
Belcaire ( 1002 m )	614° jour	283 mm	19.4 mm
Carcassonne (110 m)	950° jour	230 mm	12 mm
Castelnaudary (170 m)	915 ° jour	232 mm	7.4 mm
Fanjeaux (360 m)	925 ° jour	223 mm	10.1 mm
Granes (312 m)	878 ° jour	251 mm	10.3 mm
Labécède Lauragais (306 m)	852 ° jour	276 mm	13.5 mm
Les Martys (780 m)	613 ° jour	469 mm	19.8 mm
Puivert (510 m)	893° jour	302 mm	17 mm
Mouthoumet (538 m)	811° jour	407 mm	10.2 mm
Saint Benoit (406 m)	829° jour	216 mm	11.8 mm



Ces sommes de températures sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles

 A retenir	Départ en végétation	Epi à 5 cm du sol	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage	Foin précoce	Foin tardif
Prairie temporaire précoce	250 ° jour	500 ° jour	750 ° jour	900 ° jour	1100 ° jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 ° jour	600 ° jour	900 ° jour	1100 ° jour	1300 ° jour
Prairie permanente de fertilité moyenne	450 ° jour	850 ° jour	1100 ° jour	1400 ° jour	1600 ° jour