

FLASH FOURRAGE

Ensilages et enrubannages doivent débuter sur la majorité des prairies précoces



Globalement nous avons toujours 10 à 15 jours d'avance en somme de températures par rapport à 2018 malgré des températures relativement fraîches sur ce mois d'avril. La pousse des prairies est globalement faible et hétérogène liée à un déficit hydrique important sur cet hiver qui n'a pas permis au démarrage de la végétation une nutrition azotée suffisante à l'ensemble des graminées notamment sur des parcelles peu fertilisées.

Néanmoins, les **prairies précoces ont atteint ou vont atteindre le stade début épiaison** (moins de 10% de plantes épiées à la parcelle), stade optimum de récolte. Pour les légumineuses notamment les prairies de luzerne, elles aussi accélèrent leur développement.

Les parcelles de sainfoin sont encore plus précoces et certaines sont déjà au stade début floraison et doivent être fauchées.



Des récoltes précoces sont toujours à privilégier car elles permettent de récolter des fourrages de très bonne qualité en pénalisant un peu le rendement de la première coupe mais en permettant de favoriser une bonne repousse pour une seconde coupe.

COMMUNES	TEMPERATURE	PLUVIOMETRIE	
		Depuis le 01/01/2019	Depuis le 01/04/2019
Alaigne (320 m)	847° jour	111 mm	37 mm
Belcaire (1002 m)	498° jour	266 mm	84 mm
Belpech (250m)	790° jour	233 mm	91 mm
Castelnaudary (170 m)	840° jour	146 mm	59 mm
Fanjeaux (360 m)	842° jour	122 mm	41 mm
Granes (312 m)	807° jour	122 mm	42 mm
Labécède Lauragais (306 m)	778° jour	177 mm	58 mm
Les Martyrs (780 m)	509° jour	328 mm	57 mm
Mouthoumet (538 m)	725° jour	134 mm	22 mm
Saint Benoit (406 m)	759° jour	157 mm	55 mm
Puivert (510 m)	785° jour	mm	65 mm

Somme des
Températures
07 avril 2019

(Données météo France)



Ces sommes de températures sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles.

	Départ en végétation	Epi à 5 cm du sol	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage	Foin précoce	Foin tardif
Prairie temporaire précoce	250° jour	500° jour	800° jour	1000° jour	1200° jour
Prairie permanente fertile et précoce	300° jour	500° jour	900° jour	1100° jour	1300° jour
Prairie permanente de fertilité moyenne	400° jour	800° jour	1000° jour	1400° jour	1600° jour