

16 Avenue du Pont de France 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 08 85 – Fax 04 68 31 47 72
Société coopérative agricole à capital variable
N° agrément préfectoral : 11190 - code NAF: 1101Z
RCS Carcassonne 775 803 117 SIRET 775 803 117 00016
N° TVA intracommunautaire FR93 775 803 117
N° agrément Dist. Phyto : LR00038 distributeur professionnel

MILDIU

Des symptômes sont observés sur grappe et sur feuilles. La situation est explosive sur certaines parcelles. Nous vous conseillons fortement de resserrer les cadences en période de floraison.



Nous vous conseillons d'utiliser des produits suivants :

MILDIU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
FORUM TOP	2.5 KG	Xn, N	H302, H317, H373, H400, H410	5 m	35 jours	48 heures
PREVASION	3 KG	Xn, N	H319 H400 H410	5 m	28 jours	24 heures
REVOLUXIO	0.5 kg	Xn, N	H317, H400, H410	20 m	21 jours	48 heures
ZORVEC TREL	1 pack 2.5 ha	Xn, N	H317, H411	5 m	28 jours	48 heures
ZORVEC BRIA	1 pack 4ha	Xn, N	H317, H411	5 m	28 jours	48 heures
SIRBEL UD	1.3 kg	Xn, N	H317, H400, H318, H351	5 m	28 jours	48 heures
CALGARY	2 KG	Xn, N	H319 H351 H400 H412 EUH208 EUH401	20 m	28 jours	48 heures

En rouge, les produits classés CMR

Sur mildiou en **agriculture biologique** :

MILDIU	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DER
KENTAN 40WG	2 Kg	Xn, N	H319, H332, H302, H410	20 m	21 jours	24 heures
BOUILLIE BORD	3,750 Kg	Xi, N	EUH401, H318, H410	5 m	21 jours	24heures
NOVICURE	1.85 Kg	Xn, N	H302, H400, H410	50 m	21 jours	6 heures

OÏDIUM

Des symptômes sont observés sur feuilles et sur inflorescence.

Comme pour le mildiou, resserrer les cadences de traitement.



Nous vous conseillons d'utiliser des produits suivants :

OIDIUM	Dose / ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
DYNALI	0.5 L	N	EUH401, H410	5 m	21 jours	6 heures
LUNA SENSATION	0.2 L	Xn, N	H410, H302, EUH208, H400	5 m	14 jours	6 heures
CYFLODIUM	0.5 L	Xn, N	H315 H411	5 m	21 jours	24 heures
VIVANDO	0.2 L	Xn, N	H411	5 m	28 jours	6 heures
YARIS	0.15 L	Xn, N	H351 H400 H410	5 m	35 jours	48 heures

En rouge, les produits classés CMR

Avec les chaleurs annoncées, nous vous conseillons d'associer du soufre.

En **agriculture biologique**, les fongicides utilisables pour lutter contre l'oïdium sont les suivants :

OIDIUM	Dose/ ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
MICROTHIOL SP DISPERS	12.5 Kg	Sc	-	5 m	21 jours	6 heures
HELIOUSOUFRE	7.5 L	Xi	H318	5 m	3 jours	24 heures
LUCIFERE	12.5 L	Sc	EUH401, EUH210, EUH208	5 m	5 jours	6 heures

PRODUITS ALTERNATIFS ET BIOCONTROLES

Ces produits ont un niveau d'efficacité souvent inférieur aux produits conventionnels. Il est préconisé de les associer avec du SOUFRE MOUILLABLE.

LIMOCIDE base 100 L d'eau, 0.6% en association avec 5 kg/ha de **MICROTHIOL**

ARMICARB 3 Kg + 2Kg/ha de **MICROTHIOL**

POUDRAGE

VEGESOUFRE à 20kg/ha ou **GRAIN D'OR** à 25 kg/ha

FLUIDOSOUFRE de 20 à 25kg/ha

Produit alternatif : **MATYS DUO** à 15kg/ha

BLACK ROT

De nombreuses parcelles présentent pour la première fois cette année des taches fructifères de black rot reconnaissables grâce à leurs pycnides caractéristiques (petits points noirs).

La majorité des produits utilisés ont une efficacité sur cette maladie qui peut très rapidement s'implanter sur les grappes et détruire la récolte.



Produits utilisables :

BLACK ROT	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
BOGARD	0.2 L	Xn, N	H302 H319 H304 H336 H315 H411	5 m	30 jours	24 heures
ENERVIN	2.5 L	Xn	H400, H410	5 m	35 jours	6 heures
DYNALI	0.5 L	N	EUH401, H410	5 m	21 jours	6 heures
BARREUR	0.3 L	Xn, N	H304 H319 H373 H411 EUH066	5 m	21 jours	24 heures
LUNA SENSATION	0.2 L	Xn, N	H410, H302, EUH208, H400	5 m	14 jours	6 heures
FORUM TOP	2.5	Xn, N	H302, H317, H373, H400, H410	5 m	35 jours	48 heures

Sur black rot en **agriculture biologique** :

BLACK ROT	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
AIRONE	2.5 L	Xn, N	H 400 H 410	20 m	7 jours	6 heures

SECURISATION DE LA FLORAISON

Rappel : Continuez les applications jusqu'à la fin de la floraison : **VIVAFLOR 2L/ha**

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE :

La période de traitement est validée du 28/05 au 08/06. Nous préconisons les produits suivants :

CICADELLE	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
DELTA STAR	0.83 L	Xn, N	H400 H410	20 m	14 jours	6 heures
LAMBDA STAR	0.125 L	Xn, N	H302 H317 H332 H410	5 m	35 jours	48 heures
DUCAT	0.7 L	Xn, N	EUH066, H410, H226, H302, H304, H317, H319, H332, H336, H400	50 m	14 jours	48 heures
MAGEOS MD	0.07 kg	Xn, N	H302 H335 H373 H400 H410	20 m	14 jours	6 heures
MANDARIN	0.3 L	Xn, N	H302 H400 H410	20 m	21 jours	6 heures

Sur cicadelle en **agriculture biologique** :

CICADELLE	Dose/ha	Classement	Phrase de risque	ZNT	DAR	DRE
PYREVERT	1.5 L	N	H410	50 m	3 jours	6 heures

Pour une meilleure efficacité :

- Appliquer de préférence en fin de journée
- S'assurer que le pH de la solution est acide compris entre 6 et 6.5
- Appliquer le produit seul de préférence
- Appliquer dans l'heure qui suit la préparation de bouillie.

PROTECTION DES ABEILLES

Nous vous conseillons de traiter le soir de préférence après le coucher du soleil. Evitez les heures précédant le lever du soleil (2 heures). Le vent doit être inférieur à 19 km/h vous limiterez ainsi vos pertes par dérive.

COLLECTE DES EVPP : MERCREDI 17 et JEUDI 18 JUIN 2020

Au dépôt appro, site du pont du Sou

De 9h à 12h et de 14h à 17h

Pensez à apporter vos emballages vides.

Les saches ne sont plus distribuées pour cause de non-conformité.

Nous vous demandons de bien **LAVER** et **RINCER** (3 fois) les bidons et de mettre les bouchons à part.

Pour les emballages papiers ou plastiques ayant contenu des produits, il nous est également possible de les recevoir dans des sacs séparés (cahier des charges ADIVALOR).

Tout sac contenant des bidons souillés ne pourra être récupéré.

Attention, ne pas confondre l'emballage avec le carton de transport.

Le service technique

Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26

Hervé MARROT 06.72.65.91.92

Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51